

Brochure botox behandeling blaas

Er is bij u een overactieve blaas gediagnosticeerd. Bij een overactieve blaas is er sprake van sterke en/of plotselinge aandrang om te plassen, met of zonder urineverlies.

Wanneer u **bloedverdunnende medicatie** gebruikt, is het van belang dit ruim voor het onderzoek, ten minste 1 week, te melden.

Wat is Botox?

Botox heeft als geneesmiddel het effect dat het de prikkeloverdracht van de zenuwen naar spieren blokkeert, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen. Als Botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en raakt deze tijdelijk verlamd.

Door een aantal injecties in de blaasspier met Botox neemt de kracht van de blaasspier tijdelijk af, gemiddeld zes tot twaalf maanden. Na injectie van botulinetoxine in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70-80% van de patiënten de klachten.

Vorbereiding

Wij adviseren u ruime/makkelijke kleding en schoenen aan te trekken. Na de behandeling mag u niet naar huis fietsen, ook niet met een elektrische fiets.

De verpleegkundige neemt u mee naar de voorbereidingsruimte. Daar krijgt u antibiotica om de kans op infectie na de behandeling te verkleinen. Daarna mag u de kleding van uw onderlichaam uittrekken en op uw rug plaatsnemen op het bed.

Vervolgens brengt de verpleegkundige een dun slangetje (katheter) in uw blaas en leegt deze. Daarna loopt via de katheter een verdoving in de blaas. Deze verdoving moet inwerken en blijft daarom tot aan de behandeling in de blaas. U mag zich daarna weer aankleden.

De behandeling

Na het inwerken van de verdoving neemt de verpleegkundige u mee naar de behandelkamer. Hier trekt u nogmaals de kleding van het onderlichaam uit.

U neemt plaats op de onderzoekstafel met de benen in de beensteunen. Daarna wordt u met steriele doeken afgedekt en brengt de uroloog de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. De cystoscoop is een holle buis waarmee de uroloog in de blaas kijkt en waardoor de instrumenten worden ingebracht. Via een slangetje aan de cystoscoop wordt de blaas geleegd en gevuld met water. Hierdoor kunt u aandrang krijgen; dit gebeurt pas op het moment dat de blaas vol is. Vervolgens injecteert de uroloog via de scoop op verschillende plaatsen de Botox in de blaasspier. De behandeling duurt gemiddeld 10 minuten.

Na de behandeling wordt u naar de recovery gebracht waar u kunt bijkomen. Daar moet u voldoende drinken en mag u pas naar huis, nadat u heeft geplast en de blaas goed leeg is. Om te controleren of de blaas goed leeg is, wordt er een echo van de blaas gemaakt. Als alles in orde is, mag u naar huis.

Zelf katheteriseren

Soms kunt u na deze behandeling (tijdelijk) niet goed plassen. In dat geval wordt u geleerd om thuis te katheteriseren.

Brochure botox behandeling blaas

Na de behandeling

Het is belangrijk dat u veel drinkt zodat de blaas goed wordt gespoeld. Drink minimaal 1,5 tot 2 liter vocht per dag. Wij adviseren geen geslachtsgemeenschap op de dag van de behandeling, daarna is dat wel toegestaan. Na de behandeling raden wij u af zelf te fietsen, ook niet met een elektrische fiets.

Nacontrole

Het kan enkele dagen tot weken duren voordat u het resultaat merkt van de behandeling. Botuline-toxine werkt zes tot twaalf maanden, als het middel uitgewerkt is kan de behandeling herhaald worden.

De controle bij de uroloog is na ongeveer 4 weken. Voor de afspraak krijgt u automatisch een brief toegestuurd met datum en tijdstip.

Mogelijke complicaties

Geen enkele behandeling is zonder risico's. Zo is ook bij deze behandeling de normale kans op complicaties aanwezig.

Bloed in de urine	Na de behandeling kunt u de eerste dagen wat bloed in de urine hebben. Dit is normaal en gaat vanzelf over, wel is het belangrijk dat u voldoende drinkt om de blaas en urinewegen schoon te spoelen. Als het bloedverlies niet vermindert en/of donkerrood van kleur is, moet u contact opnemen met de Keizer Kliniek.
Blaasontsteking	Door dit onderzoek kunt u een blaasontsteking oplopen. Hoewel dit niet heel vaak voorkomt, kan het zijn dat u bij aanhoudende klachten een antibioticakuur voorgeschreven dient te krijgen.
Niet kunnen plassen	U kunt niet meer plassen, of kunt niet volledig meer uitplassen. U moet dan tijdelijk enkele keren per dag katheteriseren met een eenmalige katheter. Wanneer dit nodig is, krijgt u van de (continentie) verpleegkundige de nodige instructie en informatie.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact met ons op.