

Brochure lasertherapie (EVLT)

De endoveneuze lasertherapie (EVLT) maakt het mogelijk de ader in het been te behandelen zonder deze te verwijderen. Met behulp van echografie wordt de niet functionerende ader op het been opgezocht. Onder lokale verdoving brengt de specialist een dunne laserdraad in het bloedvat. Met de laserenergie wordt het bloedvat dichtgebrand. Na ongeveer vier tot zes weken is het resultaat zichtbaar. Op basis van het resultaat kan, in overleg met u, besloten worden dat een aanvullende behandeling nodig is.

Indien u **bloedverdunnende medicatie** gebruikt, moet u dit bespreken met uw behandelend arts.

Vorbereiding

Wij adviseren gemakkelijke kleding en schoenen aan te trekken. Op de avond voor en op dag van de behandeling mag u GEEN bodylotion, crèmes of oliën gebruiken op het te behandelen been.


Wij vragen u een begeleider mee te nemen die u naar huis kan rijden. Het is wettelijk niet toegestaan om na de verdoving of sterke pijnstilling zelf te rijden. U bent dan niet verzekerd.

De behandeling

De assistente desinfecteert uw been en dekt uw been af met steriele doeken. De specialist zoekt met behulp van de echo de te laseren ader(en) op, vervolgens wordt de huid lokaal verdoofd.

Na de verdoving prikt de specialist de ader aan. Er wordt een dun voerdraad in de ader opgevoerd en de katheter ingebracht. Via deze katheter brengt de specialist de laser in de ader.

U krijgt nog een aantal verdovingen in het been langs het te behandelen traject. Deze verdovingen zorgen ervoor dat het weefsel rondom de ader wordt gekoeld en dat u geen pijn voelt tijdens de behandeling.



Na de behandeling

Op de plaats waar de katheter naar binnen is ingebracht, wordt er een hechtpleister geplakt.

U hoeft geen steunkous te dragen, maar u krijgt een buisverband aangemeten. Deze moet u de eerste 3 uur na de behandeling aanhouden.

Wij adviseren u de eerste week niet te sporten, geen gebruik te maken van sauna en zwembad, of heet te douchen. Afhankelijk van het werk dat u doet, kunt u na 1 à 2 dagen weer aan het werk.

Brochure lasertherapie (EVLTL)

Mogelijke complicaties bij een EVLT laser behandeling

Geen enkele ingreep is zonder risico's. Zo is ook bij deze ingreep de normale kans op complicaties aanwezig.

Verkleuring	Een enkele keer kan de huid verkleuren. Deze verkleuring verdwijnt na enkele weken tot maanden. Zelden treedt een blijvende verkleuring van de huid op.
Bloedingen	Kleine bloedingen zijn normaal, deze bloedingen kunnen blauwe plekken veroorzaken. Bij aanhoudende bloedingen moet u direct contact met ons opnemen.
Zenuwschade	In zeer zeldzame gevallen kan een zenuw schade oplopen als gevolg van de behandeling. Bij schade aan een zenuw kan rond het behandelde gebied gevoelloosheid optreden of soms juist pijn.
Infectie	Een infectie is zeldzaam. Bij roodheid pijn in combinatie met koorts moet u direct telefonisch contact met ons opnemen.
Allergische reactie	Een enkele keer kan een overgevoelige of allergische reactie ontstaan. Dit kan zich uiten door roodheid, jeuk en/of vochtblaasjes.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact met ons op.