

Brochure skintag behandeling

Het verwijderen van skintags wordt toegepast bij anale huidflapjes die mogelijk zijn ontstaan door de aanwezigheid van aambeien in het verleden. Ook kan een skintag ontstaan wanneer er in een ader rondom de anus een stolsel zit wat later weer is genezen.

Vorbereiding

Wij adviseren gemakkelijke kleding aan te trekken. Na de behandeling kunt u niet zelf autorijden of fietsen. Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat iemand u thuisbrengt.

Wanneer u **bloedverdunnende medicatie** gebruikt, is het van belang dit ruim voor het onderzoek, ten minste 1 week, te melden.

De behandeling

De specialist verdooft het huidflapje door middel van een injectie. Daarna verwijdert de specialist het huidflapje. Indien nodig worden er oplosbare hechtingen geplaatst.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u direct naar huis. U kunt de eerste twee weken forse pijnklachten hebben..

Mogelijke complicaties

Bloedverlies	Kleine hoeveelheid bloedverlies komt vaak voor na een skintag behandeling doordat de anus zeer veel bloedvaten bevat. Dit bloedverlies is echter van korte duur. Indien u meer bloed verliest dan een kopje, moet u contact opnemen.
Wondinfectie	Een infectie aan de wond is zeldzaam. Bij koorts, een scherpe rode rand om de wond en/of extreme pijn aan de wond moet u direct telefonisch contact opnemen.
Allergische reacties	Soms zien we allergische reacties op de verdoving of het desinfectiemiddel. De reactie kan zich uiten door een directe lokale of een geheel lichamelijke roodheid. Jeuk en vochtblaasjes kunnen ontstaan. De allergische reactie is direct goed met medicatie te behandelen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact met ons op.