

Brochure skintag operatie

Het verwijderen van skintags wordt toegepast bij anale huidflapjes die mogelijk zijn ontstaan door de aanwezigheid van aambeien in het verleden. Ook kan een skintag ontstaan wanneer er in een ader rondom de anus een stolsel zit wat later weer is genezen.

Vorbereiding

Wij adviseren gemakkelijke kleding en schoenen aan te trekken

Na de operatie mag u niet zelf autorijden of fietsen. Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat iemand u thuisbrengt.

Indien u bloedverdunners gebruikt moet u dit bespreken met uw behandelend arts.
In overleg met uw behandelend arts kan deze medicatie mogelijk tijdelijk gestaakt worden.

De operatie

U wordt onder narcose gebracht door de anesthesist. De specialist verwijdert het huidflapje. Indien nodig worden er oplosbare hechtingen geplaatst.

Na de operatie

Zodra u na de operatie goed wakker bent mag u naar huis. U kunt de eerste twee weken forse pijnklachten hebben.

Mogelijke complicaties

Bloedverlies	Kleine hoeveelheid bloedverlies komt vaak voor na een skintag behandeling doordat de anus zeer veel bloedvaten bevat. Dit bloedverlies is echter van korte duur. Indien u meer bloed verliest dan een kopje, moet u contact opnemen.
Wondinfectie	Een infectie aan de wond is zeldzaam. Bij koorts, een scherpe rode rand om de wond en/of extreme pijn aan de wond moet u direct telefonisch contact opnemen.
Allergische reacties:	Soms zien we allergische reacties op de verdoving of het desinfectiemiddel. De reactie kan zich uiten door een directe lokale of een geheel lichamelijke roodheid. Jeuk en vochtblaasjes kunnen ontstaan. De allergische reactie is direct goed met medicatie te behandelen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact met ons op.